



ALOPECIA E PSICOFARMACOS

Perda de cabelo em Psicofarmacologia.

Medicação induz alopecia sendo este um efeito colateral ocasional de muitos psicofarmacos. A maior parte dos estabilizadores do humor e antidepressivos pode levar a esta condição. Alguns antipsicóticos e agentes ansiolíticos induzem a alopecia. A queda de cabelo também esta relacionada ao hipotireoidismo, que pode ser induzida pelo lítio e outros agentes. A alopecia pode não ser relatada por alguns pacientes, mas os médicos devem estar cientes deste potencial problema que pode contribuir para o descumprimento do tratamento. Lítio provoca a perda de cabelo em 12-19% dos usuários de longo prazo. O ácido valproico e/ou valproato causa alopecia em até 12% dos pacientes numa relação dose dependente.



Com exposição à elevada concentração de valproato a ocorrência observada é de até 28% dos pacientes. Estes fármacos podem também mudar a cor e a estrutura do cabelo. A ocorrência de alopecia induzida pela carbamazepina é igual ou inferior a 6%, a perda de cabelo é menos comum com outros estabilizadores do humor. Os antidepressivos tricíclicos, maprotilina, trazodona e praticamente toda a nova geração de antidepressivos pode, em raras ocasiões, levar a alopecia. O mesmo se aplica ao haloperidol, olanzapina, risperidona, clonazepam e buspirona, mas o mesmo não se aplica a outros neurolépticos, benzodiazepínicos ou barbitúricos, selecionados anti-histamínicos e anti parkinsonianos. Interrupção da medicação ou redução da dose quase sempre leva a melhorar a queda.

Mercke Y, Sheng H, Khan T, Lippmann S.

Hair loss in psychopharmacology.

Department of Psychiatry and Behavioral Science, University of Louisville School of Medicine, Kentucky, USA

Ann Clin Psychiatry. 2000 Mar;12(1):35-42.

Biotina	10mg
Zinco quelado	25mg
L-cisteína	80mg
L-cistina	25mg
L-metionina	200mg
Vitamina B6	10mg
Pantotenato de cálcio	25mg
Vitamina B2	1mg

Mande 30 cápsulas

**Posologia: Tomar 1 cápsula em jejum ou
longe das refeições**

Biotina	5mg
Silício orgânico	200mg
L-metionina	200mg
Selênio metionina	25mcg
Zinco quelado	25mg
Picnogenol	30mg
Pantotenato de cálcio	25mg

Mande 30 cápsulas

Posologia: Tomar 1 cápsula em jejum ou longe das refeições

Minoxidil	3%
Auxina Tricogena	10%
Loção capilar qsp	50 ml

Posologia: Aplicar 20 gotas no couro cabeludo diariamente

Auxina Trigogena	10%
aFGF	0,5%
bFGF	0,5%
Copper-peptideo	0,5%
VEGF	0,5%
Loção capilar qsp	50 ml

Posologia: Aplicar 20 gotas no couro cabeludo diariamente

Outras Referências:

Estudo	Referência
Foram medidos os níveis séricos (Zinco) e os níveis de Cobre em 52 crianças epiléticas que foram tratadas com carbamazepina ou ácido valproico ou com uma combinação destes dois fármacos. Os níveis séricos de zinco foram significativamente mais baixos nos epiléticos que nos grupos controles que consistiu de 7 epiléticos não tratados e 12 crianças normais. A terapia combinada e com monoterapia com carbamazepina aumentou os níveis séricos de cobre.... Os nossos resultados indicam que a homeostase de metais encontrados podem ser afetados pela terapia anti epilética.	<u>Sözüer DT, Barutçu UB, Karakoç Y, Yalçın E, Onen S.</u> The effects of antiepileptic drugs on serum zinc and copper levels in children. <u>J Basic Clin Physiol Pharmacol.</u> 1995;6(3-4):265-9.
A média de cabelo e sorologia dos níveis de Zn foram encontrados reduzidos em 3 e seis meses de tratamento, em comparação com os valores de pré tratamento, enquanto a média sorologia de biotinase foi menor do que os valores de pré tratamento no terceiro mês de tratamento, mas voltou aos valores normais no sexto mês de tratamento.....	<u>Yilmaz Y, Tasdemir HA, Pakso MS.</u> The influence of valproic acid treatment on hair and serum zinc levels and serum biotinidase activity <u>Eur J Paediatr Neurol.</u> 2009 Sep;13(5):439-43.
Conclusão: o estudo mostrou que o uso do ácido valproico reduziu no soro e tecido do fígado a biotinase prejudicando a utilização da biotina, afetando assim o fígado. A parcial deficiência da biotinase pode levar a alopecia. Esta pode ser prevenida pela suplementação de biotina nos pacientes que receberam terapia de ácido valproico. Considerou-se que mais estudos são necessários para determinar a dose de biotina eficaz e segura.	<u>Arslan M, Vurucu S, Balamtekin N, Unay B, Akin R, Kurt I, Ozcan O.</u> The effects of biotin supplementation on serum and liver tissue biotinidase enzyme activity and alopecia in rats which were administered to valproic acid. <u>Brain Dev.</u> 2009 Jun;31(6):405-10..
O diagnóstico de alopecia requer uma compreensão do crescimento normal do cabelo é mais bem analisada na sequência de uma história clínica, exame e a manutenção de um elevado nível de suspeita de alopecia ocorrem em cerca de 10% dos pacientes que foram administrados lítio, até 12% de pacientes em uso de valproato e cerca de 5% dos indivíduos em uso de carbamazepina. Gestão da alopecia inclui técnicas de cuidadosa do cabelo, a suplementação mineral, o tratamento com minoxidil. Alopecia devido a drogas estabilizadoras do humor podem ser potencialmente identificadas e administradas sem a suspensão da medicação.	<u>McKinney PA, Finkenbine RD, DeVane CL.</u> Alopecia and mood stabilizer therapy <u>Ann Clin Psychiatry.</u> 1996 Sep;8(3):183-5.

R. R. Wickett · E. Kossmann · A. Barel · N. Demeester · P. Clarys · D. Vanden Berghe · M. Calomme
Effect of oral intake of choline-stabilized orthosilicic acid on hair tensile strength and morphology in women with
Wne hair
Arch Dermatol Res. 2007 Dec;299(10):499-505. Epub 2007 Oct 25.



Encontre uma Imafar mais perto de você!

VITÓRIA

Jardim Camburi

📍 R. Italina P. Mota, 177
☎ 3237-1934
📞 98889-9655

Praia do Suá

📍 R. Misael P. da Silva,
98, Ed. Empire Center
☎ 3325-3750
📞 98854-1508

Jardim da Penha

📍 Pça. Regina Frigeri
Furno, 340 - Lj. 110
☎ 3382-3200
📞 98889-9654

Jardim Camburi II

📍 Av. Armando D.
Rabello, 126, Ed.
Unique Mall

VILA VELHA

Centro

📍 R. Henrique Moscos, 1018
☎ 3399-6363
📞 99849-9809

Itapoã

📍 R. Fortaleza, 30
☎ 3389-6788
📞 99849-9809

C. de Itaparica

📍 Av. Sta. Leopoldina, 575
☎ 3299-0102
📞 99849-9809

SERRA

Laranjeiras

📍 R. Álvares Cabral, 38
☎ 3138-7051
📞 98854-1527

CARIACICA

Campo Grande

📍 Av. Campo Grande, 35
☎ 3136-2220
📞 99656-4101

ST. TERESA

Centro

📍 R. Cel. Bonfim Júnior, 188
☎ 3259-3663
📞 99704-1688

Atendimento via WhatsApp e E-mail

A FARMÁCIA IMAFAR também disponibiliza aos clientes o serviço de entrega em domicílio na Grande Vitória e por SEDEX para todo o Brasil.



www.imafar.com.br



[farmaciaimafar](https://www.facebook.com/farmacaiamafar)



[imafarfarmacia](https://www.instagram.com/imafarfarmacia)